

הוראות לבדיקת קולונוסקופיה וירטואלית עם הכנת פיקולקס

מתאים לכל הנבדקים למצט נבדקים: מעל גיל 50, נבדקים העוקים במחלת כליות כרונית והנוטלים תרופות אשר עלולות לפגוע בתפקוד הכליות, או נבדקים עם ספיקת לב.

מסגרת הבדיקה תוחדר צינורית לפי הטבעת דרכה המצי העם מנופח עם אויר חדר על מנת לבצע בהמשך שיחזור תלת מימדי של פנים המצי העם כאילו שהאנדוסקופ טייל לאורך כל המצי (כפי שמתבצע בקולונוסקופיה מכשירנית). הבדיקה מאפשרת לרופא לאבחן גידולים ממאירים. ופוליפים. הבדיקה לא מתאימה לאיבחון דלקות כמו כן לא ניתן לקחת במהלך הבדיקה דגימות רקמה וכריתה של פוליפים.

הבדיקה מבוצעת ללא הרדמה והיא כרוכה באי נעימות משנית לניפוח המצי עם אויר. התחושה היא של כמצין גזים. ניפוח המצי מתבצע על מיטת ה CT ובהמשך מבוצעות שתי סריקות CT (ציילומים), האחת בשכיבה על הבטן והשנייה בשכיבה על העם. הבדיקה אורכת 15 דקות. אחריהם הנבדק יכול לאכול. לשתות. לנהוג. ולחזור לשיטת יומיו. אין צורך במלווה. סיבוכים אפשריים הם דימום כיתמי קל מפי הטבעת במידה ויש טחורים. יש להקפיד על הכנה טובה של המצי על מנת לאפשר שיחזור תלת מימדי אבחנותי לגילוי פוליפים וגידולים.

הוראות ההכנה:

- כיון שבדיקה זו היא לא מכשירנית ולא מתבצעות בה ביופסיות אפשר להמשיך את כל הטיפולים התרופתיים כרגיל כולל קומדין ואספירין יום לפני הבדיקה ובבוקר הבדיקה בתאום עם רופא מטפל מומלץ לא לקחת תרופות נגד סכרת.
- יום לפני הבדיקה אפשר לאכול ארוחת בוקר ללא פירות או ירקות ואחריה יש לרוקן תכולת שקית אחת של פיקולקס לכוס מימ קרימ, לערבב היטב במשך 3 דקות (עד שהחומר יימס היטב) ולשתות. לאחר שתית הכוס, יש לשתות לפחות שני ליטר נוזלים נוספים (8 כוסות) במשך 4 שעות.
- מרגע התחלת ההכנה מותר שתיית נוזלים בלבד (מימ, תה, מרק צח גלי צליל ומיצים).

- השעה 11:00 בבוקר ביום לפני הבדיקה יש לקחת 2 כדורי LAXADIN.
- יש לחזור על שתית הפיקולקס בשעה 19:00. יש לשתות שוב לפחות שני ליטר נוזלים במשך 4 השעות הבאות.