

הוראות לבדיקת קולונוסקופיה - וירטואלית עם מרוקן

הכנה זו מתאימה לבדיקות מעל גיל 50, ולבדיקות האלקים במחלת כליות כרונית, נוספים תרופות אשר עלולות לפגוע או להפחית את תפקוד הכליות, ולבדיקות עם אי ספיקת לב.

הסבר קצר על הבדיקה:

במסגרת הבדיקה תוחדר צינורית לפי הטבעת. דרכה המעי הגס מנופח עם אוויר על מנת לבצע בהמשך שיחזור תלת מימדי של פנים המעי הגס. כאילו שהאנדוסקופ טייל לאורך כל המעי (כפי שמתבצע בקולונוסקופיה מכשירנית). הבדיקה מאפשרת לרופא רדיוולוג לאבחן גידולים ממאירים ופוליפים. הבדיקה לא מתאימה לאבחון דלקות. כמו כן, לא ניתן לקחת במהלך הבדיקה דגימות רקמה ולבצע כריתה של פוליפים.

הבדיקה מבוצעת ללא הרדמה והיא כרוכה באי נעימות מסוימת לניפוח המעי עם אוויר תחושה דומה לגמי. ניפוח המעי מתבצע על מיטת ה CT ובהמשך מבוצעים שני צילומי CT האחד בשכיבה על הבטן והשני בשכיבה על הגב. הבדיקה עורכת 15 דקות. אחריהם הנבדק יכול לאכול לשתות, לנהוג, ולחזור לשגרת יומו. אין צורך במלווה.

סיבוכים אפשריים הם דימום כתמי קף מפי הטבעת במידה ויש טחורים. יש להקפיד על הכנה טובה של המעי על מנת לאפשר שחזורי תלת מימדי אבחנות.

הוראות ההכנה:

1. בבדיקה זו כיוון שהיא לא מכשירנית ולא מתבצעות בה ביופסיות אפשר להמשיך את כל הטיפולים התרופתיים כרגיל כולל קומדין ואספירין. מומלץ בתאום עם רופא מטפל לא לקחת ביום טרם הבדיקה ובבוקר הבדיקה (בשלב הצום) תרופות נגד סכרת. 2. יום לפני הבדיקה אחרי ארוחת בוקר קלה (ללא פירות וירקות) יש לשתות את תמיסת "המרוקן", בקצב של כוס אחת כל רבע שעה עד לסיום כל הכמות (3 ליטר). רצוי לשתות כל הכוס בבת אחת ולא לאט.

3. מרגע התחלת שתית המרוקן הכלכלה היא נוזלית בלבד וכוללת: מי, תה, מרק צח מיצים צלולים ואלי.

4. חצי שעה לפני שתיית המרוקן ניתן ליטול כדור של פרמין 10 מ"ג נגד בחילות. (רק במידה ואין רגישות יתר או אלרגיה לתרופה זו).

5. בשעה 11:00 בבוקר ביום לפני הבדיקה יש לט לאקחת 2 כדורי LAXADIN.